

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 6 - 5 - 70 055492

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE-SE-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE-ET-MARNE.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

BULLETIN N° 115

Supplément n° 3

29 AVRIL 1970

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

CULTURES FRUITIÈRES

Actuellement :

- Risques de contamination modérés tant que les températures resteront peu élevées : maturation des périthèces lente; pluies quasi journalières, donc projections répétées mais faibles, quoique en légère augmentation; temps d'humectation nécessaire pour les contaminations relativement long.
- Par contre, perte d'efficacité des traitements assez rapide : pluies fréquentes; surtout accroissement de la végétation, important du fait du déroulement des feuilles.
- Apparition possible de taches vers le 10 mai, elles devraient être peu nombreuses. Tenir compte de ces différents éléments pour l'application d'un nouveau traitement.

INFORMATIONS

D I V E R S

- PUCERONS, ACARIENS, CHENILLES (cultures fruitières) : Faibles colonies de P. vert du pommier dans de nombreux vergers. Sorties notables des femelles de l'Araignée jaune (*T. urticae*), début d'éclosion de l'Araignée rouge (*P. ulmi*) en situations favorables; premiers dégâts de Phytiopte du poirier. Sorties des chenilles de Bombyx cul-brun; extension des dégâts de Cheimatobie et autres Tordeuses. Pour les Acariens, un traitement ne peut éventuellement se justifier que contre l'Araignée jaune.
- MONILIA DU CERISIER ET DU PRUNIER : Envisager une nouvelle pulvérisation après la chute des pétales.
- DESSECHEMENT DES JEUNES POUSSES DU FRAMBOISIER (*Didymella*). Appliquer un traitement avec : Thirame (200 g.), Mancozèbe (160 g.), ou Dithianon (50 g.), m.a./hl.
- POURRITURE GRISE SUR FRAISIER (*Botrytis*). Les traitements doivent débuter dès le début de la floraison et se poursuivre jusqu'au début du rougissement des premiers fruits. Utiliser : Dichlofluamide (20 g.), Thirame (60 g.), à l'are.
- TARSONEME DU FRAISIER : cet acarien qui entraîne de graves déformations du feuillage peut-être combattu avant floraison avec : Endosulfan (60 g.), Dicofol (75 g.) Diazinon (60 g.), de m.a./hl. Bien mouiller l'ensemble de la plante.
- MOUCHE DE L'ASPERGE : Dans les jeunes cultures non encore en production, appliquer un traitement sur les pousses dès leur sortie du sol.
- MOUCHE DU CHOU : Le vol se poursuit faiblement.
- SITONE DU POIS : Premières attaques. La végétation lente favorise les dégâts de ce ravageur.
- ENNEMIS DU COLZA : Les populations de Mèligèthes sont très variables; elles sont parfois sérieuses dans des pièces où les colzas ayant encore leurs boutons groupés sont très vulnérables. L'évolution peu rapide des boutons accroît les risques de dommages.

Les Charançons des siliques restent peu nombreux.

L'Ingénieur et l'Agent technique
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

R. SARRAZIN.

Dernière note : Bulletin 115 - Supplément 2. - 23 Avril 1970.

7228

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX.
47, Av. Paul Doumer - 93 - MONTREUIL-SOUS-BOIS.